



EUROPLANT

ODMIANY

2025 | 2026

WIEMY CO SADZIĆ!



EUROPLANT

SPIS ODMIAN

Albertine	10
Anuschka	12
Belana	14
Bernina	16
Bellarosa	18
Catania	20
Corinna	22
Jelly	24
Larissa	26
Marabel	28
Mariola	30
Monique	33
Montana	35
Otolia EKO	36
Red Sonia	38
Vineta	40

Jeśli sadzisz materiał z własnego zbioru odmian chronionych,
musisz uiścić opłatę dla hodowcy za odstępowstwo rolne.

WIEMY CO SADZIĆ



EUROPLANT to innowacyjna, działająca na skalę międzynarodową firma handlowa w sektorze ziemniaków sadzeniaków. Jako koncern zajmujący się komercjalizacją sadzeniaków odmian powiązanych z nami hodowli, posiadamy niezbędny know-how hodowlany i działamy w ponad 70 krajach na całym świecie.

NASZA WIZJA – hodujemy, by nakarmić świat i chronić naszą planetę.
NASZA MISJA – pracujemy na rzecz nowoczesnego, wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

W branży ziemniaczanej, jesteśmy postrzegani jako rzetelny i uczciwy partner biznesowy. Nasz sukces opiera się na trzech filarach – odmiany, kompetencje, serwis.

ODMIANY EUROPLANT – różnorodność i jakość:

Nasze odmiany są hodowane klasycznie przy użyciu konwencjonalnych technik hodowlanych, bez używania genetycznie modyfikowanego materiału nasienne. Od wielu lat udoskonalanie naturalnej odporności i zwiększanie wydajności upraw są priorytetem naszych prac rozwojowych nad odmianami. Nasz asortyment obejmuje ponad 100 rodzajów odmian jadalnych, przetwórczych i skrobiowych. Każda z naszych odmian jest unikalną kombinacją odpowiednich parametrów, zapewniających doskonałą jakość, która potrafi sprostać różnorodnym oczekiwaniom naszych Klientów.

PROFESJONALIZM EUROPLANT

–know-how i kompetencje:

Wysoka jakość naszych sadzeniaków to wynik stosowania integrowanego systemu produkcji.



Od hodowli in vitro oraz produkcji mini-bulw i sadze­niaków przedbazowych w naszych gospodarstwach nasiennych, po dużą liczbę doświadczonych rolników kontraktowych, kontrolujemy jakość naszej produkcji.

Nasi doradcy dzielą się z wiedzą i kompleksowo wspierają plantatorów tak by zagwarantować pomyślną produkcję ziemniaków i dobrać idealne narzędzia marketingowe. Ze względu na posiadanie własnych zakładów produkcji sadze­niaków, rozumiemy potrzeby naszych plantatorów i rolników, którzy zawsze mogą polegać na wiedzy naszych doświadczonych ekspertów.

Jednym z ważnych aspektów naszego profesjonalizmu jest produkcja sadze­niaków dla rolnictwa ekologicznego. Również w tym sektorze oferujemy szeroką gamę odpornych i doskonałych odmian gwarantujących najwyższą jakość.

SERWIS EUROPLANT

– wspieramy i dzielimy się wiedzą:

Pomagamy naszym klientom, oferując rzetelne doradztwo agrotechniczne. Od wyboru odmian po zbiory, przechowywanie i marketing – nasi eksperci zapewniają cenne wsparcie. Liczne wizyty polowe u naszych klientów stanowią podstawę rekomendacji odmianowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.


**UPRAWIASZ
ZIEMNIAKI?
KUPUJ
KWALIFIKOWANE
SADZENIAKI!**

 **ZAKUP
SADZENIAKA
TO NAJLEPSZA
INWESTYCJA!
TO PODSTAWA
BEZPIECZEŃSTWA
FITOSANITARNEGO**

 **TO
GWARANCJA
WYSOKIEGO
PLONU
HANDLOWEGO
I DOBREJ JAKOŚCI**

  **TO
SATYSFAKCJA
KONSUMENTA**

**TAK ROŚNIE
INTERES PRODUCENTA!**





**Kupując sadzeniaki
zwiększasz potencjał
własnego gospodarstwa**



**To już ponad 29^{lat}
razem!**

W tym okresie sukcesywnie rozwijaliśmy nasiennictwo naszych odmian osiągając w roku 2025 ponad 1500 ha plantacji nasiennych w Polsce. Nieustannie gwarantujemy najwyższą jakość sadzeniaków z naszej produkcji oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie technologii uprawy ziemniaków. Aktywnie towarzyszymy intensywnym zmianom na rynku jakościowego ziemniaka jadalnego. Wspólnie z Wami wyznaczamy kierunki rozwoju poszczególnych sektorów produkcji ziemniaka, szukając najlepszych rozwiązań w zakresie doboru odmian i agrotechniki, by sprostać wymaganiom rynku i konsumentów. To dzięki Wam i dla Was, nieustannie się uczymy i rozwijamy! Bo miarą naszego sukcesu jest Wasze zaufanie i zadowolenie.

WIEMY CO SADZIĆ

Dziękujemy!

TYPY KULINARNE (KONSUMPCYJNE)

Typ kulinarny to określenie przydatności odmiany na różne cele kulinarne (potrawy) z uwagi na zwięźłość miąższu. Ziemniaki są pyszne i bardzo je lubimy, dlatego poznanie cech odmiany i jej typu kulinarnego pozwala najlepiej dobrać odpowiednie ziemniaki do naszych ulubionych potraw.

Typ A sałatkowy:

miąższ po ugotowaniu pozostaje zwięzły, dający się łatwo pokroić w plastry, kostkę, ósemki. Ziemniaki typu **A** doskonale nadają się na sałatki, smażone ziemniaki i do zup. Kostka lub plaster zostaje w całości po ugotowaniu lub smażeniu.

Typ B ogólnoużytkowy:

miąższ po ugotowaniu jest dość zwarty, ale pod widelcem lekko się rozgniata. Ziemniaki tego typu spożywamy najczęściej jako gotowane do obiadu w towarzystwie mięs i sosów.

Typ C mączysty:

miąższ po ugotowaniu jest rozsypany się i wyraźnie mączysty. Ziemniaki tego typu nadają się na placki, puree, frytki.

Typ D bardzo mączysty

Pomiędzy tymi typami występują również typy pośrednie np AB, BC czy BBC łączące oba typy lub mające tendencje bardziej do typu B lub C.

BARDZO WCZESNE JADALNE	typ kulinarny	kolor miąższu	kształt bulwy	% skrobi
Albertine	B	żółty	ow	11,5
Anuschka	AB	żółty	oow	12,0
Catania	B	kremowy	ow-pow	12,0
Corinna	B	żółty	ow	12,0
Red Sonia	B	żółty	ow czerw. sk.	12,0
WCZESNE JADALNE	typ kulinarny	kolor miąższu	kształt bulwy	% skrobi
Larissa	B	żółty	ow	13,0
Marabel	B	żółty	ow	13,0
Monique	A	żółty	pow	12,5
Bellarosa	B	żółty	oow czerw. sk.	12,7
Otolia EKO	B	żółty	ow	13,0
Vineta	AB-B	żółty	oow	12,7
ŚREDNIO WCZESNE JADALNE	typ kulinarny	kolor miąższu	kształt bulwy	% skrobi
Mariola	B	żółty	oow	12,0
Madeira	B	j. żółty	ow	13,0
Montana	AB	żółty	ow	13,0
Bernina	A	żółty	pow	12,0
ŚREDNIO PÓŹNE DO PÓŹNYCH JADALNE	typ kulinarny	kolor miąższu	kształt bulwy	% skrobi
Jelly	B-BC	żółty	oow	14,8

Wszystkie nasze odmiany jadalne charakteryzuje brak ciemnienia miąższu surowego i gotowanego

WIEMY
CO SADZIĆ



NAJWCZEŚNIEJSZA

Albertine

**ogólnoużytkowa (typ B),
bardzo wczesna odmiana jadalna**

- bardzo ładny optycznie wygląd,
- szybko dojrzewająca,
- gładka skórka.

10


Albertine

- Odmiana bardzo wczesna (80-85 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- P_2O_5 80 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha,
- N 140-150 kg/ha, łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- K_2O 200-220 kg/ha (jako K_2SO_4).

Uwagi

- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi parcha ziemniaka,
- Stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kielków,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę: przed-, jak i powschodową,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- ALBERTINE wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych,
- W czasie dojrzewania, w razie konieczności stosować tylko niewielkie dawki deszczowania.



11

WIEMY CO SADZIĆ



Anuscka

**bardzo wczesna, do wczesnej
jadalna odmiana sałatkowa, typ AB**

- żółty, czysty miąższ,
- wysoka jakość typu sałatkowego,
- odpowiedni kształt bulw,
- gładka skórka, płytkie oczka,
- bardzo wysoki plon handlowy,
- bardzo odporna na wtórny wzrost bulw.

Anuscka

Odznacza się wysoką jakością bulw, gładką skórka i płytkie oczka decydują o jej przydatności do mycia i pakowania we wcześniejszym okresie.

Wymagania glebowe: Anuscka preferuje średnie do dobrych gleb z równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe i wodę. Unikać stanowisk sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości.

Sadzenie: kalibraż 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie, co 30-32 cm (około 43 tys. roślin/ha). Zaprawianie i głębokość sadzenia – standardowo, jak w innych odmianach. 3-4 dni przed sadzeniem, ze względu na dobry spoczynek kielków, zaleca się pobudzić sadzeniaki w wyższej temperaturze, jest wrażliwa na uszkodzenia kielków. Niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.

Nawożenie: Azot – ogólnie do 160 kg (łącznie z Nmin., nawożeniem organicznym i korekta ze względu na stanowisko). Na polach zagrożonych wymywaniem, dzielić dawki powyżej 80 kg. Przy podkietkowaniu nie dzielić dawki. **Potas** – K₂O 200–250 kg/ha, zalecana forma siarczanowa. **Fosfor** P₂O₅ – 100 kg/ha, przed sadzeniem w formie rozpuszczalnej w wodzie. **Magnez** – 60 kg/ha – dla zapewnienia ilości i jakości plonu. Ogólnie nie zaleca się nawożenia dolistnego, tylko na słabszych stanowiskach – uzupełniająco. Dobra, przeciętna zdrowotność roślin. Mimo dobrej zdrowotności roślin, zaleca się standardowa ochronę przed zarazą.

Wczesność	bardzo wczesna do wczesnej	Bulwy	okragłotowalny
Walory kulinarne	typ kulinarny AB - sałatkowy, czysty, żółty miąższ	Kształt Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	bardzo płytkie żółty gładka
Plon	wyrównany, bulwy średniej wielkości, z małą ilością bulw drobnych	Odporność	Ro 1+4 wysoka wysoka
Wschody	stosować początkowo wolniejsze, podkietkowanie lub pobudzanie	Nicień Zaraza ziemniaka Wirusy	
Przechowywanie	stabilny spoczynek kielków, nadaje się do przechowywania	Podatność	niska do średniej średnia niska średnia
		Parch Rdzawa plamistość Obicia Uszkodzenia	

WIEMY
CO SADZIĆ



Belana

wczesna odmiana sałatkowa,
segment premium,
bardzo długie przechowywanie

- jakościowa odmiana sałatkowa, typ AB,
- czysty, żółty kolor miąższu,
- wysoka jakość kulinarna po ugotowaniu,
- wysoki plon towarowy.


Belana

- Odmiana wczesna (85-100 dni wegetacji), w typie A (sałatkowa), z bardzo długim okresem przechowywania,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-20 cm	14-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	16-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: SADZIĆ 3 CM GŁĘBIEJ




Nawożenie

- P_2O_5 80-100 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha,
- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu, zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 3/4 : 1/4),
- K_2O -280-300 kg/ha (jako K_2SO_4 , do 100 kg można zastosować w formie KCl), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 3/4 : 1/4.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi (w przypadku BELANY nie przekraczać dawki 250 g sub. czynnej),
- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi rdzawej plamistości bulw,
- Stosować pobudzanie bulw, sadzić w ogrzanej glebie, wzorcowe pobudzanie: kielki wielkości główki od szpilki. Unikać obłamywania kielków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, również stosowaną powschodowo,
- BELANA jest lekko wrażliwa na zarzę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych.



WIEMY CO SADZIĆ



Bernina

średnio wczesna odmiana sałatkowa

- średnio wczesna, typ A,
- intensywnie żółty kolor miąższu,
- bulwy ładne, podłużno owalne,
- wysoki plon handlowy.


Bernina

- Odmiana średnio wczesna (90-120 dni wegetacji), bardzo plenna, lekko sałatkowa – typ AB,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	13-14 cm
	35/55	27-30 cm	22-24 cm
+60	28/35	18-20 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: SADZIĆ 3 CM GŁĘBIEJ



Nawożenie

- N 120-140 kg/ha, łącznie z N min. (zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki: 3/4 przed sadzeniem i 1/4 pogłównie),
- K₂O 280-300 kg/ha (jako K₂SO₄) – odmiana tolerancyjna na suszę, jednak przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- P₂O₅ 80 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Stosować pobudzanie bulw,
- Po wschodach BERNINA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego nie powinno się środków opartych na tej substancji stosować powschodowo (jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy podzielić dawkę, stosując jednorazowo maks. 200 g środka i po 4-5 dniach zabieg powtórzyć),
- BERNINA ma mniejsze o ok. 20 % zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych odmian z tego segmentu,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.



WIEMY
CO SADZIĆ



Bellarosa

wczesna odmiana jadalna

- czerwona skórka,
- bardzo dobra trwałość przechowalnicza,
- wyjątkowy smak,
- córka odmiany Vineta,
- bardzo duże bulwy.


Bellarosa

- BELLAROSA odmiana bardzo wczesna (75-80 dni wegetacji), typ B – ogólnoużytkowy,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Wymagania glebowe: niskie do średnich,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	13-14 cm	11-13 cm
	35/55	22-24 cm	18-20 cm
+60	28/35	16-18 cm	13-14 cm
	35/55	28-30 cm	23-25 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA




Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-120 kg/ha, łącznie z N min. (forma amonowa lub amidowa + przedplon, przy zastosowaniu nawadniania zaleca się stosować dzielenie na dwie dawki: 1/4 przed sadzeniem i 3/4 pogłównie, krótko przed zawiązywaniem bulw. Przy oczekiwanym plonie 60+ nawożenie dzielić na dwie dawki w proporcjach 2/3 : 1/3. Bez nawadniania skuteczniejsze jest stosowanie amidowej formy azotu),
- K₂O 280-300 kg/ha, możliwa forma KCl, przy nawadnianiu dzielić nawożenie na 2 dawki: 1/2 i 1/2,
- P₂O₅ 100 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk z dużą skłonnością do powstawania rdzawej plamistości bulw,
- Sadzeniaki powinny być fizjologicznie dojrzałe, stosować pobudzenie bulw,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną przed-, jak i powschodowo (przy stosowaniu powschodowym, zaleca się dzielić oprysk na 2 dawki, po 200 g, drugi zabieg po 4-5 dniach),
- Po zawiązaniu bulw zaleca się 1 lub 2 zabiegi dolistne NPK,
- BELLAROSA jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.



WIEMY
CO SADZIĆ



Catania

**bardzo wczesna, jadalna odmiana,
typ B**

- bardzo wczesna dojrzałość,
- kremowo biały miąższ,
- gładka skórka z płytkimi oczkami,
- wysoki plon, bulwy owalne skłonne do dużych,
- brak skłonności do rdzawej plamistości miąższu.


Catania

- Odmiana bardzo wczesna (95-115 dni wegetacji), w typie B (ogólnoużytkowym),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibr sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA




Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min. (korzystna jest forma azotanowa), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 240-300 kg/ha (jako K_2SO_4), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Nadaje się szczególnie na średnio do lepszych stanowisk. Należy unikać stanowisk sprzyjających powstawaniu parcha ziemniaka,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Podkielkowanie albo pobudzanie bulw umożliwiają szybszy wzrost i wcześniejszy zbiór. Należy unikać obłamywania kielków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, bulwy są odporne na rdzawą plamistość miąższu,
- W razie potrzeby i możliwości korzystnym jest zabieg nawadniania, przed zawiązywaniem się bulw,
- Po kwitnieniu, ewentualnie 7-10 dni później wskazane jest nawożenie dolistne (maks. 6 kg N/oprysk),
- CATANIA jest wrażliwa na zarzę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych do końca wegetacji.



WIEMY CO SADZIĆ



Corinna

**bardzo wczesna odmiana
ogólnoużytkowa**

- ładne kształtne bulwy,
- szybko dojrzewająca, gładka skórka,
- wyrównany kalibr.


Corinna

- Odmiana bardzo wczesna (85-90 dni wegetacji), w typie B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeńców, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibr sadzeńców	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	29-30 cm

NORMALNA GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA:




Nawożenie

- P_2O_5 80 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha,
- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibru),
- K_2O 250-220 kg/ha (jako K_2SO_4).

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi parcha ziemniaka,
- Stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kielków,
- CORINNA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego należy unikać stosowania jej po wschodach,
- Zaleca się dolistne nawożenie borem, pierwszy zabieg 10 dni po kwitnieniu, kolejny po następnych 7 dniach
- CORINNA jest średnio wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Po osiągnięciu dojrzałości skórki (skorkowaceniu) należy przeprowadzić desykację roślin i odpowiednio wczesny zbiór.



WIEMY CO SADZIĆ



Jelly

**średnio późna odmiana jadalna,
typ B-BC**

- wyjątkowy smak,
- kształtne bulwy – nadaje się do pakowania,
- bardzo wysoki plon – pow. 50 t/ha,
- żółta barwa miąższu.


Jelly

- Odmiana średnio późna (135-140 dni wegetacji), typ B-BC, bardzo plenna,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	27-28 cm
+60	28/35	20-21 cm	17-18 cm
	35/55	35-36 cm	29-30 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 120-130 kg/ha, łącznie z N min. (przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- K₂O 300-350 kg/ha (przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie),
- P₂O₅ 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Warto pobudzać bulwy na kilka dni przed sadzeniem (bardziej wyrównane wschody),
- Sadzić tylko w ciepłą, ogrzaną glebę, minimalna temp. gleby na 10 cm – 10°C,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę do- brze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną przedwschodowo, jednak średnio wrażliwa przy stosowaniu powschodowym,
- Nie stosować preparatów zawierających chlomezon,
- JELLY jest wrażliwa na alternarię, zaleca się wczesną i systematyczną ochronę fungicydową.




WIEMY
CO SADZIĆ



Larissa

średnio wczesna odmiana
ogólnoużytkowa

- wysoki plon handlowy
- gładka skórka, bardzo ładny optyczny wygląd
- żółty i smaczny miąższ
- dobry spoczynek kiełków
- nadaje się do dłuższego przechowywania




Larissa

- Odmiana średnio wczesna (125-130 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibr sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	14-15 cm
	35/55	27-29 cm	23-24 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	32-34 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-130 kg/ha w formie amonowej/amidowej, łącznie z N min., (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 25% przed sadzeniem i 75% krótko przed lub w czasie zawiązywania bulw. Bez nawadniania dobre wyniki daje zastosowanie stabilizującej formy nawozu azotowego. Alternatywnie: 30 kg/ha przed sadzeniem, 60 kg/ha N przed wschodami, resztę po 5-6 kg/ha N dolistnie po kwitnieniu (można łączyć z innymi zabiegami ochrony roślin),
- P₂O₅ 100 kg/ha,
- K₂O 300-350 kg/ha (najlepiej w formie K₂SO₄), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 50% przed sadzeniem i 50% przed zwarciem rzędów,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw: podnieść temperaturę bulw do 15° C, czas 1-2 tygodnie w zależności od dojrzałości fizjologicznej bulw,
- Zapotrzebowanie na azot jest niższe w porównaniu do innych odmian w tym segmencie,
- Krótko po kwitnieniu zaleca się 1-2 opryski dolistne nawozami P-K,
- Desykacja powinna odbywać się w sposób stopniowy,
- LARISSA wykazuje lekką wrażliwość na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powszechnie.



WIEMY
CO SADZIĆ



Marabel

**bardzo plenna,
wczesna odmiana jadalna,
typ konsumpcyjny B**

- żółty i czysty kolor miąższu,
- ładny optycznie kształt bulwy,
- wyjątkowy smak,
- idealna do pakowania.


Marabel

- Odmiana wczesna (115-120 dni wegetacji),
- Prosta w uprawie, w warunkach krótkotrwałej suszy i wysokich temperatur daje wysokie i stabilne plony,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha,
- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu) - rozdzielone w dwóch dawkach 2/3 : 1/3,
- K_2O 280-300 kg/ha (jako K_2SO_4 ; do 140 kg można w formie KCL), przy nawadnianiu w dwóch dawkach 2/3 : 1/3.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości,
- Preferuje lepsze stanowiska zasobne w wilgoć i składniki pokarmowe,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Należy unikać sadzenia ziemniaków w zmianowaniu na danym polu, nie częściej niż co 4 lata,
- Marabel jest wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo, należy jej unikać w stosowaniu, (jeżeli to konieczne, to w dwóch dawkach, z maks. 200 g sub. czynnej i powtórką po 4-5 dniach).



WIEMY
CO SADZIĆ



Mariola

ogólnoużytkowa (typ B),
średnio-wczesna odmiana jadalna

- wysoki plon handlowy,
- bardzo ładny optycznie wygląd,
- gładka skórka, odpowiednia do mycia,
- dobry spoczynek.


Mariola

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie kulinarnym B,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	33-35 cm	28-29 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA




Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P₂O₅ 100 kg/ha,
- K₂O 270-350 kg/ha (jako K₂SO₄), odmiana tolerancyjna na suszę, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 : 1/2,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości oraz parcha ziemniaka,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kielków tuż przed sadzeniem,
- Odmiana o wysokiej odporności na wirusy i średniej na zarazę ziemniaka,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę stosowaną powszechnie, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki maksymalnie po 200 g w odstępie 5 dni),
- Desykacja powinna odbywać się w sposób stopniowy – stosować dzielenie dawki,
- Mariola ze względu na cienką skórkę jest lekko wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw, w temperaturze poniżej 25° C.



WIEMY
CO SADZIĆ



Monique

wczesna odmiana sałatkowa,
segment premium

- żółty miąższ,
- ładne kształtne bulwy,
- gładka, jasna skórka.


Monique

- Odmiana wczesna (115-125 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości sadzeniaków należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibr sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	34 cm	28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- MONIQUE ma mniejsze o 20% w porównaniu z podobnymi odmianami tego segmentu zapotrzebowanie na azot (120-130 kg/ha, łącznie z N min.),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O minimum 270-300 kg/ha (w formie K_2SO_4),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać obłamywania kielków,
- Zaleca się zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- MONIQUE nie wykazuje wrażliwości na metrybuzynę, stosowaną zarówno przed, jak i po wschodach,
- Z uwagi na dużą wrażliwość liści na zarazę ziemniaka, zalecana jest systematyczna ochrona przed tą chorobą, dlatego dla lepszej ochrony należy stosować fungicydy z różnych grup chemicznych (różnorodne substancje czynne), aż do momentu zbioru bulw,
- Desykacja (niszczenie naci) nie powinna przebiegać gwałtownie, należy stosować mniejsze dawki podzielone na 2-3 zabiegi.



WIEMY CO SADZIĆ



Montana

**średnio wczesna
odmiana sałatkowa**

- owalne bulwy o żółtym miąższu,
- wyrównany plon handlowy,
- długotrwałe przechowywanie.


Montana

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie AB - sałatkowym, przydatna do długotrwałego przechowywania, o ładnej gładkiej skórze i płytkich oczkach,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeńców, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibr sadzeńców	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 120-130 kg/ha, łącznie z N min. (preferowana forma amonowa lub mocznikowa, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- K_2O 250-280 kg/ha (jako K_2SO_4) – przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Preferuje lepsze stanowiska z równomiernym zaopatrzeniem w wodę i składniki pokarmowe, jednak na słabszych glebach plonuje nadal bardzo wysoko,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksytrobiny dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać obłamywania kielków tuż przed sadzeniem, wskazane pobudzenie bulw (3-4 dni przed sadzeniem),
- MONTANA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powszodowo, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki maksymalnie po 200 g w odstępie 5 dni),
- Odmiana wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.



WIEMY CO SADZIĆ



Otolia

**ogólnoużytkowa (typ B),
średnio wczesna odmiana jadalna**

- dojrzałość średnio wczesna,
- żółty miąższ,
- owalny, ładny wygląd bulw,
- wyrównany kalibraz i plon handlowy,
- sprawdzona w ekologicznym systemie uprawy.




Otolia

- Odmiana średnio wczesna (135-140 dni wegetacji), w typie kulinarnym B, dedykowana do produkcji ekologicznej z uwagi na wysokie odporności na wirusy i zarazę ziemniaka,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraz sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	28-30 cm	23-25 cm
+60	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	32-34 cm	27-28 cm

GLĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej lub amidowej,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 270-350 kg/ha (jako K_2SO_4), przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Uprawa odpowiednich międzyplonów (rzodkiew oleista) = efekt biofumigacji = wprowadzenie do gleby drobno posiekanych roślin z rodziny kapustnych, powoduje powstawanie izotiocyjanianów, które są bardzo skuteczne w zwalczaniu szkodliwych patogenów glebowych,
- Generalnie zaleca się chemiczne zaprawianie bulw, korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powszechnie,
- Nie formować zbyt wysokich rzędów przed wschodami,
- OTOLIA jest lekko wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, należy mieć to na uwadze w czasie zbioru.





Red Sonia

bardzo wczesna odmiana ogólnoużytkowa

- wczesny czas dojrzewania,
- czerwona, gładka skórka,
- wyrównane bulwy z płytkimi oczkami,
- żółty, smaczny miąższ.

Red Sonia

Zalecenia uprawowe: Red Sonia ma wymagania średnie do wysokich. Wymaga jednolitego zaopatrzenia w wodę i składniki odżywcze oraz stanowiska w dobrej kulturze rolnej. Przy uprawie pod osłonami wymaga podkiewkowania, a bez osłon sadzeniaki należy pobudzić. Wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.


Wymagania szczególne: Red Sonia tworzy średnią liczbę bulw, więc odległość roślin w rzędzie musi być odpowiednio zaplanowana. Standardowe odległości sadzenia (75 cm rzędy) bulwy 30 do 32 cm (~ 43.000 rośliny/ha).

Nawożenie: Red Sonia jest wdzięczna za zrównoważone nawożenie. **Azot** o łącznej wartości w czystym składniku do 160 kg/ha (w tym zasobność po przedplonie +/- korekta stanowiska). **Potas** 200–250 kg/ha i fosfor 100 kg/ha. **Magnez** 60 kg oraz mikroelementy dostosować do stanowiska i wymagań jakościowych plonu. Sadzeniaki należy zaprawiać i stosować pełną praktykę fungicydową. Po osiągnięciu dojrzałości Red Sonia wymaga 3 tygodni do pełnego skorkowacenia skórki.

Red Sonia to bardzo smaczny ziemniak o pięknej czerwonej skórce.

Wczesność	bardzo wczesna	Bulwy	
Walory kulinarne	typ kulinarny B, ogólnoużytkowy, brak ciemnienia po ugotowaniu	Kształt Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	owalny płytkie żółty gładka, czerwona
Wschody	szybkie	Odporność Nielenie Wirusy Zaraza	Ro 1-5 wysoka średnia
Przechowywanie	długi spoczynek kielków, dobre przechowywanie	Podatność Parch Rdzawa plamistość Obicia Uszkodzenia	nieznaczna nieznaczna nieznaczna nieznaczna

WIEMY
CO SADZIĆ



Vineta

wczesna odmiana jadalna

- bardzo dobry smak,
- wysoka jakość kulinarna,
- odporna na suszę,
- nadaje się na gleby lekkie,
- miąższ surowy oraz po ugotowaniu,
- nie ciemnieje.

Vineta



Wczesna odmiana jadalna, o bardzo dobrej jakości odżywczej i jasno żółtym miąższu.

Wymagania glebowe: Vineta wymaga gleb średnich jak i średniego zapotrzebowania na wodę. Nadaje się również do uprawy na gleby lekkie, ale utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Odporna jest na stres związany z suszą.

Wymagania szczególne: Vinetę należy sadzić w rozstawie rzędów 75 cm, co 28-30 cm. Jest bardzo wdzięczna za harmonijne nawożenie: **N** – 160 kg/ha, **K** – 200 do 250 kg/ha, **P** – 100 kg/ha lub pełna dawka obornika 350 q/ha pod głęboką orkę zimową (obornik konieczny jesienią). Uwzględnić należy również nawożenie mikroelementami. Vineta wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo. Jest średnio podatna na zarazę ziemniaczaną i alternariozę, jednak dla zapewnienia wysokich plonów i dobrego przechowywania bulw zaleca się standardowy program oprysków fungicydami. W celu wyrównania wschodów i ochrony przed rizoktoniozą, zaleca się zaprawianie sadzoniaków. Zbiór należy wykonać w temp. pow. 12 st. C, co pozwala ograniczyć uszkodzenia bulw, a następnie przez 2-4 tyg. zaleca się wentylowanie i schłodzenie w celu wysuszenia i zabielenia uszkodzeń.

Vineta jest bardzo spokojna pod względem kiełkowania, dlatego zachowuje bardzo dobrą jakość konsumpcyjną do późnej wiosny. Wyrównane plony powyżej 400 q/ha. Wysoki udział frakcji handlowej 95%.

Wczesność	wczesna	Bulwy	
Walory kulinarne	typ kulinarny AB-B ogólnoużytkowy, wyjątkowo smaczna, zawartość skrobi 12,7%, miąższ może lekko rozsypany się po ugotowaniu	Kształt Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	okragłoovalny płytkie - średnio płytkie jasnożółta szorstka
		Odporność Nicienie Wirusy	Mątwik ziemniaka Ro 1 średnia do dużej
Wschody	wczesne		
Przechowywanie	długi okres spoczynku	Podatność Parch Rdzawa plamistość Czarna plamistość Uszkodzenia Czarna nóżka	mała bardzo mała średnia mała mała



**Nasze odmiany chronione są
wyłącznym prawem hodowcy**

Użycie ich ponownie do sadzenia z własnego
materiału, nakłada obowiązek opłaty za odstęp-
stwo rolne na rzecz hodowcy.

Kontakt

Biuro:



Elżbieta Tysiak
*Specjalistka
ds. logistyki i sprzedaży*
Tel. +48 734 474 193
Mail Elzbieta.Tysiak@europant.biz



Dorota Michałowska
*Asystentka
działu nasiennictwa*
Mob. +48 605 308 088
Mail dorota.michalowska@europant.biz



Katarzyna Bednarczyk
Księgowa
Tel. +48 728 480 043
Mail Katarzyna.Bednarczyk@europant.biz

Doradcy klienta:



Katarzyna Zdziechowicz
odmiany chipsowe
Tel. +48 660 568 901
Mail Katarzyna.Zdziechowicz@europant.biz



Krzysztof Martyna
odmiany skrobiowe
Tel. +48 664 476 782
Mail Krzysztof.Martyna@europant.biz



Michał Pulut
odmiany jadalne
Tel. +48 728 480 011
Mail Michal.Pulut@europant.biz

Dyrekcja:



Dr hab. Sławomir Wróbel
*Dyrektor
ds. nasiennictwa i produkcji*
Tel. +48 602 606 233
Mail Slawomir.Wrobel@europant.biz



Jarosław Stawiszynski
*Dyrektor
ds. handlowych*
Tel. +48 668 431 117
Mail Jaroslaw.Stawiszynski@europant.biz

Kupując sadzeniaki nie musisz płacić
hodowcy za odstępstwo od



EUROPLANT Polska Sp. z o.o.

Laski Koszalińskie 3a

76-039 Biesiekierz

e-mail: epp@europlant.biz

www.europlant.biz



foto: Marcin Golik/kreatywnie.org
Archiwum Europlant